

# Vrouwen Geneesmiddelenreclames

## Steeds die dagelijkse zorgen



### Hoe kom ik dáár toch af...

Chronische zorg verhindert dikwijls hardnekkig de genezing van de patiënt en vormt zodoende een moeilijk onderdeel van het gehele klinische beeld. 'Drinamyl' – een ideale combinatie van 'Dexedrine' en amylobarbital - helpt U om dit probleem te verlichten aangezien

het de gedachtengang 'normaliseert' en de levensopvattingen verbetert, tengevolge waarvan de patiënt beter in staat is om moeilijkheden onder het oog te zien. Gedurende zulk een tijd is de verlichting van klachten een stimulans voor verbetering.

'Drinamyl' is uitsluitend op recept verkrijgbaar in flacons à 25 tabletten

## 'DRINAMYL'

is van onschatbare waarde


*Op verzoek worden gaarne nadere inlichtingen verstrekt*

*Smith Kline & French Intern. Comp. Eigenaren van de Merken 'Dexedrine' en 'Drinamyl' Philadelphia Pa. U.S.A.*

Vertegenwoordigers voor Nederland

DLP711H

H. DE HAAS Rz. PHARMACEUTISCHE GROOTHANDEL N.V. NIEUWE KADE 4, TELEFOON 22523 - 20563, ARNHEM



bij  
spanning  
angst  
depressie  
obsessie  
suicide poging  
nerveuse jeuk

# LARGACTIL

3 - chloro - (3' - dimethylamino - 10 - propyl) - phenothiazine hydrochloride

*brengt rust*



wordt op aanvraag door de alg. ziekenfondsen toegestaan:


**klinisch:** ernstige psychiatrische aandoeningen, kunstmatige winterslaap  
als anti-emeticum (meningitis, zwangerschaps-braken)

**poliklinisch:** als onderhoudsdosis voor klinisch ingestelde psychiatrische patiënten  
als hulpmiddel (op verzoek) bij poliklinische psychiatrische behandeling  
gevallen van carcinoom, gepaard met ernstige pijn en braken

# MAGNESIUM-PERHYDROL



**EEN WELDAAD VOOR VELEN!**




VAN DE **PUBERTEIT**  
TOT DE **MENOPAUSE...**




***Dysmenorrhœa***

 **UXORYL**



Specilline

POMMADE  
SPECILLINE



*Perimal*

Reclame uit 1966.

Anno 2023 zou dit klachten opleveren





*Fluor albus....*



**\* Trikolpon + Kolpolyn**

\* voor ziekenfondsverzekerden toegestaan



**QUIÉTAL**  
**QUIÉTUDE**

FRANÇOIS PRODRAS



„...welke methode voor geboorteregeling adviseert u, dokter?“

## **LYNDIOL 2.5**

**22 TABLETTEN**

de eenvoudige,  
betrouwbare  
a-conceptieve methode



- het doseringsschema is zeer eenvoudig: 22 dagen een tablet - 6 dagen geen tablet;
- zowel de eerste als de laatste tablet van elke serie wordt steeds op dezelfde dag van de week ingenomen;
- de menstruatieperiode kan naar voorkeur worden bepaald; een menstratievrij weekend is hierdoor mogelijk.

Samenstelling: 2,5 mg lynestrenol en 0,075 mg mestranol per tablet.  
Verpakkingen: strip à 22 tabletten met etui en 3 strips à 22 tabletten met etui.

AFLUKIN-C neemt men dus de dubbele hoeveelheid extra tot zich.

## WANNEER AFLUKIN-C?

Men begint AFLUKIN-C te gebruiken, wanneer griep of verkoudheid in aantocht zijn. Dan kan dit middel zijn krachtigste werking ontplooiën. In tijden van griep en verkoudheid gebruikte men derhalve regelmatig

## AFLUKIN-C

### DOSERING:

Tenzij de arts anders voorschrijft:

's morgens en 's avonds:

volwassenen	2 tot 3 dragée's
kleine kinderen	1 dragée
grotere kinderen	2 dragée's

Dragée's in hun geheel (of in tweeën gedeeld) met een weinig water innemen, niet opzuigen.

# AFLUKIN-C

wordt gefabriceerd door de






Het oog wil óók wat  
Het oog wil

**MURINE!**

*Revolutionair nieuws uit*  
**AMERIKA**

Onbekwam  
en wispelturig



klinische opzoeken

# Quaname

GEDEPONEERD MERK

nieuwe factor  
tegen angst

*bezorgt gemoedsrust  
ontspant de spieren*





Gezonde slaap - onbezorgd ontwaken

**GRÜNENTHAL**

**Softenon**<sup>®</sup>  
druppels






# Colluspray<sup>®</sup>

Collutorium in de vorm van "spray"

A. Christiaens n. v. - Brussel



*aw* **MINOZINAN** *aw*

# Meprodorm-



Ideaal combinatie-preparaat als  
ontspannend slaapmiddel te gebruiken!



## Samenstelling (per tablet) :

50 mg. butylethyl-barbituurzuur (= Dormiretten)  
25 mg. methyl-phenyl-ethyl-barbituurzuur  
200 mg. meprobamaat-NDF (= Holbamaat-NDF)

## Indicaties :

acute en chronische slaapstoornissen, die gebaseerd zijn op nerveuze grondslag; ook voor slaapstoornissen van arteriosclerotische, psychotische en postencephalitische genese.

## Dosering :

Volwassenen 1 tablet een half uur vóór het slapen gaan; de tabletten eventueel in een warme vloeistof te nemen.  
In ernstige gevallen kan de dosis verhoogd worden tot 1½ of 2 tabletten.

## Handelsverpakkingen :

20, 100 of 1000 tabletten.

# Meprodorm-





PREGNYL•GESTYL•GESTYL-TESTO



Vibtil

*"Nog maar één keer per maand  
aan mijn anticonceptie denken?"*



NUVARING® 