



wanneer de gangbare therapie de emotioneel gestoorde patiënt met een somatische aandoening niet "bereikt", vergemakkelijkt

INDE... JUNI 1965

Trilafon

de benadering



Wanneer de
dagelijkse problemen
**OVERDREVEN
AFMETINGEN**
aannemen

SERESTA*

Wyeth

het NIEUWE anxiolyticum waarop de patiënt actief blijft.

SERESTA*
(oxazepam)

- bestrijdt alle symptomen van angst en spanning
- werkt snel
- herstelt SEREiniteit en STAbiliteit

Indicaties:

Angst, spanning (al of niet met hoofdpijn), opwinding, prikkelbaarheid en slapeloosheid.

Verpakkingen:

Tabletten van 10 mg in doordrukverpakking van 50 voor publiek. In 500 en 1000 voor apotheek en ziekenhuis.

Wyeth


Philadelphia, U.S.A.

conc. WYETH LABORATORIA N.V.,

* ged. handelsmerken.

Amsterdam 18 - Osdorp.

er is een
betere manier
om uw
brakende
patiënten
te behandelen...




overgevoeligheid
vermoeidheid
nervositeit
depressie
rugpijn
hoofdpijnen
prikkelbaarheid
functionele maagdarfstoornissen

veel voorkomende klachten van een veel geziene patiënte



de nerveuze vrouw



Valium Roche

Van de emotie tot de laesie

De weg van de emotie tot de organische laesie is tegenwoordig dank zij neurofysiologische, neurofarmacologische en psychiatrische onderzoekingen in al zijn stadia bekend en aantoonbaar geworden.

Het is hierbij gebleken, dat het limbische systeem, dat via de hypothalamus met de neurovegetatieve en hormonale functiegebieden in correlatief verband staat, als substraat van de emotie van centrale betekenis is.

Door de dosis-selectieve beïnvloeding van dit substraat van de emotie met (Valium) Roche gelukt het daarom, niet slechts emotionele maar ook emotioneel veroorzaakte functionele stoornissen en organische laesies doeltreffend te behandelen.

Indicaties: Alle ziektebeelden, die door de volgende symptomen worden beheerst of begeleid: emotionele spanning, angst, opwin-

ding, onrust, hypochondrische trekken. Emotioneel veroorzaakte cardiovasculaire, bronchorespiratoire, gastro-intestinale en uroge-

nitale stoornissen, emotioneel veroorzaakte hoofdpijn. Centraal en perifeer veroorzaakte spierspasmen.

(Valium) bevat als werkzame stof 7-Chloor-1, 3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2 H-1, 4-benzo-diazepin-2-on (diazepam)

Volgens Regeling en Klapper (Valium) tabletten voor ziekenfondsverzekerden toegestaan

F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G., Bazel
Vertegenwoordiging voor Nederland:
N.V. Gaba, Hilversum, Tel. 44454

Valium - Trade Mark

Mogadon = Trade Mark



Mogadon

beschutting en bescherming
voor onrustige zielen,

werkt

- snel inslaaptijd in 60 tot 65% der gevallen
minder dan 30 minuten¹;
- langdurig ongeveer acht uur³;
- natuurlijk te allen tijde en onafhankelijk van de dosis²
gemakkelijke wekbaarheid.

ROCHE

(Mogadon) bevat als werkzame
stof het benzodiazepinederivaat
1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-
1,4-benzodiazepine-2-on
(Nitrazepamum).

Literatuur

1. Félix, H., *Cah. méd. lyonnais* 41, 1131-1134 (1965).
2. Fouks et al., in: *Congrès de Psychiatrie et de Neurologie
de langue française, Marseille, Comptes rendus, Vol. 1,*
pp. 712-716. Ed. P. Warot, Paris: Masson, 1965.

Als het hart te keer gaat,
hoef je 't niet per se
aan je hart te hebben.

Xanax.[®]
Als angst de
oorzaak is.



Sarotex[®]

(amitriptyline)

Antidepressivum met werking op agitatie, angst, onrust en spanning

Geen tolerantieverhoging – geen gewenning


Lundbeck

«Saridon»
'Het drogbeeld schoonheid, te midden van tranen.'
YEATS (1865-1939)


Effectieve bestrijding van
pijntoestanden bij de vrouw met

«Saridon»

het analgeticum voor
de gynaecologie



**Onthutsend feit (1): liefst 92 van de 100 echtparen
krijgen meer kinderen dan was "gepland."**



NIEUW

STEDIRIL-d 150/30

(0,15 mg d-norgestrel + 0,03 mg ethinyloestradiol)



Het orale contraceptivum
met slechts
30 GAMMA OESTROGEEN

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes and nose. The image is overlaid with several semi-transparent, overlapping circles of varying sizes, creating a layered effect. The woman has light-colored eyes and is wearing red lipstick. The background is dark, making the face stand out.

betaserc
betahistine

Als het de patiënt duizelt...


**Waarom
bij chronische
gewrichtsaandoeningen
een opbouwende therapie
nodig is**



Terwijl u aan
haar bezeerde
pols denkt
denkt zij aan
haar acne



HAAR LUST. HAAR LEVEN.



Samenstelling: per tablet 50 mg of 100 mg fluvoxaminemaleaat.

Indicatie: Behandeling van depressies.

Eigenschappen: Fevarin is een antidepressivum met specifieke serotonine re-uptake remmende eigenschappen. Fevarin kan worden gebruikt voor korte of langere behandelingsduur en kan zondig worden gecombineerd met benzodiazepines.

Waarschuwingen: Bij lever of nier-aandoeningen dient met een lage dosering te worden begonnen, onder zorgvuldige controle.

Tot 150 mg per dag is geen invloed op rijvaardigheid of bedienden van werktuigen gevonden. Voorzichtigheid blijft echter geboden.

Bijwerkingen: Misselijkheid, soms met braken, wordt het meest waargenomen, maar neemt gewoonlijk af na 2 weken. Verder komen voor slaperigheid, obstipatie, oculustvermindering, agitatie en tremor. Eventuele vegetatieve klachten zijn niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan de therapie. In enkele gevallen is een verhoging van leverenzymwaarden geconstateerd bij patiënten zonder bekend leverlijden. De leverenzymwaarden herstelden spontaan na het staken van de behandeling.

Interacties: Niet gelijktijdig met of binnen 2 weken na M.A.O.-remmers gebruiken. Tijdens therapie met Fevarin kunnen propranolol en warfarine plasmaspiegels stijgen. De werking van alcohol kan worden gepotentieert.

Dosering: 100-200 mg per dag, individueel te verhogen tot 300 mg in 2 à 3 giften. De aanvangsdosering bedraagt meestal 100 mg per dag. Deze kan in een eenmaal daagsc gift worden gegeven, bij voorkeur 's avonds.

Handelsvormen:
- Fevarin 50: 30 of 60 tabletten per verpakking.
- Fevarin 100: 30 tabletten per verpakking.

Duphar Nederland B.V.
Postbus 7133,
1007 JC Amsterdam



**FEVARIN. SNELLE VERBETERING VAN DE STEMMING.
ELEGANTE THERAPIE BIJ VEEL PSYCHO-SOMATISCHE KLACHTEN.**





WANDER


Melleril[®]
antipsychoticum

Melleretten[®]
psycho-relaxans



15 mg Dalmadorm

het slaapmiddel voor oudere patiënten



**ZOLOFT® IS EFFECTIEF
ÉN GEEFT WEINIG
GEWICHTSTOENAME. ⁽¹⁻⁶⁾**

Zoloft®
(sertraline)

**Effectief én vriendelijker
voor vrouwen.**

DE DEPRESSIE VOORBIJ



 Fluvoxamine
FEVARIN[®]
Het Enige Monocyclische Serotonerge Antidepressivum

duphar Upjohn

Fevarin 50/100. Samenstelling: per tablet 50 mg of 100 mg fluvoxaminemaleaat. **Indicatie:** Behandeling van depressies. **Eigenschappen:** Fevarin is een antidepressivum met specifieke serotonine re-uptake remmende eigenschappen. Fevarin kan worden gebruikt voor korte of langere behandelingsduur en kan zo nodig worden gecombineerd met benzodiazepinen. **Waarschuwingen:** Bij lever- of nieraandoeningen dient met een lage dosering te worden begonnen, onder zorgvuldige controle. **Voorzichtigheid** is geboden bij patiënten met epilepsie in de anamnese. Tot en met 150 mg per dag is geen invloed op rijvaardigheid of bediemen van werktuigen gevonden. **Voorzichtigheid** blijft echter geboden. **Bijwerkingen:** Misselijkheid, soms met braken, wordt het meest waargenomen, maar neemt gewoonlijk af na 2 weken. Verder komen voor slapeloosheid, obstipatie, eetlustvermindering, agitatie en tremor. Eventuele vegetatieve klachten zijn niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan de therapie. In enkele gevallen is een verhoging van leverenzymwaarden geconstateerd bij patiënten zonder bekend leverlijden. De leverenzymwaarden herstelden spontaan na het staken van de behandeling. **Interacties:** Niet gelijktijdig met of binnen 2 weken na M.A.O.-remmers gebruiken. Fevarin kan de afbraak vertragen van farmaca, die worden gemetaboliseerd door oxidatie in de lever. Interactie is mogelijk met farmaca met een nauwe therapeutische index (bijv. warfarine, fenytoïne en theofylïne). **Voorzichtigheid** is geboden bij de combinatie met lithium, in verband met de kans op versterking van de serotonerge werking van Fevarin. Tijdens therapie met Fevarin kunnen propranolol plasmaspiegels stijgen. De werking van alcohol kan worden gepotentieerd. **Dosering:** 100-200 mg per dag individueel te verhogen tot 300 mg, in 2 à 3 giften. De aanvangsdosering bedraagt meestal 100 mg per dag. Deze kan in een eenmaal daagse gift worden gegeven bij voorkeur 's avonds. **Handelsvormen:** - Fevarin 50: 30 of 60 tabletten per verpakking. - Fevarin 100: 30 tabletten per verpakking. Duphar Nederland B.V., Postbus 7133, 1007 JC Amsterdam.